

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

6 Août 1982

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION PROVENCE ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

ALPES de HAUTE PROVENCE HAUTES ALPES ALPES MARITIMES BOUCHES DU RHONE HAUTE CORSE COTE D'AZUR SUD VAR VAUCLUSE SUD DE LA DROME

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Siège de la circonscription: 24 Rue Edouard Delanglade - 13008 MARSEILLE

Station d'Alertes Quartier Cantarel MONTFAVET Adresse Postale B.P. 95 84140 MONTFAVET - TELEPHONE (90) 88 21 83  
ABONNEMENT ANNUEL 85 F REGISSEUR DE RECETTES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE AVIGNON CCP MARSEILLE 9660 74 V

SPECIAL CORSE N°13

## VIGNE

### MILDIOU -

D'assez nombreuses sorties de taches sont observées depuis une huitaine de jours dans les situations les plus humides. Si ce n'est déjà fait effectuer sans tarder le dernier traitement à la bouillie bordelaise que nous avons préconisé au début de la véraison. Dans les jeunes plantations ce traitement est indispensable pour préserver les feuilles et permettre un bon aoûtement des bois.

### TORDEUSES DE LA GRAPPE -

Le troisième vol vient seulement de débuter dans les secteurs les plus précoces. Il est encore trop tôt pour intervenir. Quelques jeunes vers sont signalés très localement depuis quelques jours notamment à Ghisonaccia, ils correspondent à une légère reprise du deuxième vol qui a eu lieu durant la deuxième décennie de Juillet et qui ne justifie pas une intervention dans l'immédiat.

## ARBRES FRUITIERS

### MOUCHE DE L'OLIVE -

Le premier vol se poursuit encore très activement avec des captures dépassant fréquemment 200 mouches par piège et par semaine.

En vergers de "Picholine" le taux d'attaque dépasse déjà dans la plupart des situations non protégées 90% d'olives piquées.

Il est conseillé en cas de lutte par pulvérisation classique de renouveler la protection au plus tard 21 jours après la précédente application.

En cas de lutte par appâts empoisonnés répéter les interventions au maximum tous les 15 jours.

En cas d'attaques déjà importantes intervenir avec un produit à action systémique tels que diméthoate, formothion ou phosphamidon.

En oliveraies traditionnelles la protection doit débuter dès à présent. Les olives les plus grosses ayant atteint le stade sensible aux piqûres. Cependant, la lutte contre la Mouche de l'olive ne se justifiera cette année que dans les rares oliveraies où une récolte est envisagée compte tenu du phénomène d'alternance de production.

### OIDIUM -

Des foyers importants d'Oïdium sont fréquemment observés sur pêchers et pommiers. Renouveler la protection sans tarder dans les vergers contaminés avec un produit spécifique.

P17

